

1

ZYGOPTERES

Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates - Limousin

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale
Charpentier, 1840

PNAO AnII PN NT VU

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Répartition




Abondant dans le sud-ouest de l'Europe et dans quelques secteurs d'Afrique du Nord. En régression dans le nord de son aire de répartition.



Présent dans la quasi-totalité des départements français métropolitains. Les populations semblent plus fragilisées dans le nord du pays.



Sa répartition régionale semble sous-estimée. Il est peu noté sur l'ensemble du Limousin sauf sur certains secteurs où l'espèce a été recherchée de façon systématique.



Détermination




♀ Corps bleu et noir et ♀ corps vert et noir



♂ Segment 2 avec un dessin de casque viking



♂ Segment 8 entièrement bleu avec généralement 2 points noirs



♀ Pronotum pourvu d'un lobe médian sur la bordure postérieure



♂ Cercoïdes en crochets et presque aussi long que les cercques.

Famille : Coenagrionidae
Genre : Coenagrion
Taille : 27-31 mm

Exuvie



X2

Présence de lamelles caudales (Zygotères) aux bouts arrondis, mentum du masque sans trou et palpes labiaux sans entaille profonde => Coenagrionidae.

