

Agrion à fer de lance

Coenagrion hastulatum

Charpentier, 1825

VU EN

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Répartition




C'est le plus commun des *Coenagrion* dans la plupart des régions boréales, il reste très localisé dans le sud.



Espèce localisée aux massifs montagneux, Vosges, Jura, Alpes du Nord, Pyrénées et Massif Central.




Il reste cantonné principalement aux secteurs les plus élevés de la Montagne limousine (au-dessus de 600m d'altitude). Il est cependant connu à l'étang de Landes (23, à 383m d'altitude).



Détermination



♂ bleu et noir ♀ plus verdâtre




♂ segment 6 présentant 2 taches bleues à la base



♂ Cercoïdes plus courts que les cerques



Teinte verte des parties inférieures du corps (notamment en dessous des yeux)



Sur 2^{ème} segment abdominal : un dessin en forme de fer de lance hasté (ou de champignon surmonté de 2 traits noirs), attention la forme du dessin peut présenter de légères variations.



♀ V aplati à la base du pronotum


Famille : Coenagrionidae
Genre : Coenagrion
Taille : 22-26 mm

Exuvie



X2

Présence de lamelles caudales (Zygoptères) aux bouts arrondis, mentum du masque sans trou et palpes labiaux sans entaille profonde => Coenagrionidae.



Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates - Limousin